

# ICD-10-Codierung bei kardiovaskulären Hochrisiko-Patienten

Dokumentationshilfe



# Inhaltsverzeichnis

ICD-10-Codierung primäre Hypercholesterinämie, gemischte Dyslipidämie, vaskuläre Erkrankungen und weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren

Seite 3	1. Patienten mit primärer Hypercholesterinämie 2. Patienten mit gemischter Dyslipidämie
Seite 4	3. Patienten mit gesicherter vaskulärer Erkrankung* 3a) Myokardinfarkt 3b) Hirninfarkt 3c) Aortenaneurysma und -dissektion 3d) Atherosklerose 3e) Sonstige
Seite 6	4. Weitere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse 4a) Herz- und Nierenkrankheiten 4b) Hypertonie 4c) Diabetes mellitus 4d) Sonstige
Seite 7	5. Unerwünschte Ereignisse unter maximal lipidsenkender Therapie
Seite 7	6. Non-Compliance

## Mögliche ICD-10-Codierung für kardiovaskuläre Hochrisiko-Patienten

### 1. Patienten mit primärer Hypercholesterinämie (familiär, nichtfamiliär)

Risikofaktor	Beschreibung	ICD-10-Code
Hypercholesterinämie	reine	E78.0

### 2. Patienten mit gemischter Dyslipidämie

Hypertriglyzeridämie	reine	E78.1
Hyperchylomikronämie	–	E78.3
Hyperlipidämie	gemischte	E78.2
	sonstige	E78.4
	nicht näher bezeichnet	E78.5
Lipoproteinmangel	–	E78.6
Störungen des Lipoproteinstoffwechsels	sonstige	E78.8
	nicht näher bezeichnet	E78.9



### 3. Patienten mit gesicherter vaskulärer Erkrankung\*

3a) Myokardinfarkt (MI)		
Diagnose	Beschreibung	ICD-10-Code
Akuter MI transmural	Vorderwand	I21.0
	Hinterwand	I21.1
	sonstige Lokalisationen	I21.2
	nicht näher bezeichnete Lokalisation	I21.3
Akuter MI	subendokardial	I21.4
	nicht näher bezeichnet	I21.9
Wiederkehrender MI	Vorderwand	I22.0
	Hinterwand	I22.1
	sonstige Lokalisationen	I22.8
	nicht näher bezeichnete Lokalisation	I22.9
Koronarthrombose	ohne nachfolgenden Myokardinfarkt	I24.0
Postmyokardinfarkt-Syndrom	–	I24.1
Akute ischämische Herzkrankheit	sonstige Formen	I24.8
Akute ischämische Herzkrankheit	nicht näher bezeichnet	I24.9
Chronischer (alter) MI	29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend	I25.20
	4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend	I25.21
	1 Jahr und länger zurückliegend	I25.22
	nicht näher bezeichnet	I25.29
3b) Hirninfarkt		
Hirninfarkt	durch Thrombose präzerebraler Arterien	I63.0
	durch Embolie präzerebraler Arterien	I63.1
	durch nicht näher bezeichneten Verschluss o. Stenose präzerebraler Arterien	I63.2
	durch Thrombose zerebraler Arterien	I63.3
	durch Embolie zerebraler Arterien	I63.4

\* Piepoli F et al. Eur Heart J. 2016; 37(29): 2315–2381.

--: Exakte Spezifikation bitte individuell mithilfe des ICD-10-Codes ergänzen.

3b) Hirninfarkt		
Diagnose	Beschreibung	ICD-10-Code
Hirninfarkt	durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	I63.5
	durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig	I63.6
	nicht näher bezeichnet	I63.9
3c) Aortenaneurysma und -dissektion		
Aortenaneurysma u. -dissektion		I71.-
Dissektion der Aorta		I71.0-
3d) Atherosklerose		
Atherosklerose		I70.-
	der Aorta	I70.0
	der Nierenarterie	I70.1
	der Extremitätenarterien	I70.2-
	sonstiger Arterien	I70.8
	generalisiert und nicht näher bezeichnet	I70.9
3e) Sonstige		
Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome		G45.-
Abnorme Befunde	bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes	R93.1
Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses		Z95.1
Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik		Z95.5
Andere arterielle Revaskularisierungsmaßnahmen		–

--: Exakte Spezifikation bitte individuell mithilfe des ICD-10-Codes ergänzen.



## 4. Weitere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse

### 4a) Herz- und Nierenkrankheiten

Risikofaktor	Beschreibung	ICD-10-Code
Chronische Nierenkrankheit		N18.-
	Stadium 1 (glomeruläre Filtrationsrate 90 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> Körperoberfläche oder höher)	N18.1
	Stadium 2 (glomeruläre Filtrationsrate 60 bis unter 90 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> Körperoberfläche)	N18.2
	Stadium 3 (glomeruläre Filtrationsrate 30 bis unter 60 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> Körperoberfläche)	N18.3
	Stadium 4 (glomeruläre Filtrationsrate 15 bis unter 30 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> Körperoberfläche [präterminale Niereninsuffizienz])	N18.4
	Stadium 5 (dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz: glomeruläre Filtrationsrate unter 15 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> Körperoberfläche [terminale Niereninsuffizienz])	N18.5
Nierenkrankheit	hypertensive	I12.-
	bei Diabetes mellitus	N08.3
Herzkrankheit	hypertensive	I11.-
Herz- und Nierenkrankheit	hypertensive	I13.-
<b>4b) Hypertonie</b>		
	primäre	I10.-
	sekundäre	I15.-
<b>4c) Diabetes mellitus</b>		
Diabetes mellitus, Typ 1		E10.-

--: Exakte Spezifikation bitte individuell mithilfe des ICD-10-Codes ergänzen.

### 4c) Diabetes mellitus

Risikofaktor	Beschreibung	ICD-10-Code
Diabetes mellitus, Typ 2		E11.-
Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition)		E12.-
Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus		E14.-

### 4d) Sonstige

Probleme mit der Lebensführung	Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen	Z72.0
--------------------------------	--	-------

## 5. Unerwünschte Ereignisse unter maximal lipidsenkender Therapie

Myalgie	Muskelschmerz	M79.1-
Schmerzen in den Extremitäten	Gliederschmerzen	M79.6-
Schlafstörungen	nichtorganische	F51.-
Hyperhidrose		R61.-

## 6. Non-Compliance

Non-Compliance	Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen	Z91.1
----------------	---------------------------------------	-------

### Notizen:

--: Exakte Spezifikation bitte individuell mithilfe des ICD-10-Codes ergänzen.  
Die ausgewählten Risikofaktoren und benannten ICD-10-Codes sind Beispiele und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzende oder weitere ICD-10-Codierungen können entnommen werden unter **icd-code.de**



CARDIOVASCULAR

Amgen GmbH, Riesstraße 24, 80992 München

DE-P-1145-0218-061765